

Aspirina Cafeina Caplets

English –

Drug Facts

Active ingredients (in each caplet)

Aspirin 500 mg (NSAID)*.....	Pain reliever
Caffeine 32.5 mg.....	Pain reliever aid
*nonsteroidal anti-inflammatory drug	

Purpose

Uses for the temporary relief of

- headache pain • backache pain • muscle aches and pains
- minor aches and pains of arthritis

Warnings

Reye's syndrome: Children and teenagers who have or are recovering from chicken pox or flu-like symptoms should not use this product. When using this product, if changes in behavior with nausea and vomiting occur, consult a doctor because these symptoms could be an early sign of Reye's syndrome, a rare but serious illness.

Allergy alert: Aspirin may cause a severe allergic reaction which may include:

- hives • facial swelling • asthma (wheezing) • shock

Stomach bleeding warning: This product contains an NSAID, which may cause severe stomach bleeding. The chance is higher if you

- are age 60 or older
- have had stomach ulcers or bleeding problems
- take a blood thinning (anticoagulant) or steroid drug
- take other drugs containing prescription or nonprescription NSAIDs (aspirin, ibuprofen, naproxen, or others)
- have 3 or more alcoholic drinks every day while using this product
- take more or for a longer time than directed

Do not use

- if you are allergic to aspirin or any other pain reliever/fever reducer
- if you have ever had an allergic reaction to this product or any of its ingredients

Ask a doctor before use if

- stomach bleeding warning applies to you
- you have a history of stomach problems, such as heartburn
- you have high blood pressure, heart disease, liver cirrhosis, or kidney disease
- you are taking a diuretic
- you have asthma

Ask a doctor or pharmacist before use if you are taking a prescription drug for

- gout • diabetes • arthritis

Stop use and ask a doctor if

- an allergic reaction occurs. Seek medical help right away.
- you experience any of the following signs of stomach bleeding:
 - feel faint • vomit blood • have bloody or black stools
 - have stomach pain that does not get better
- pain gets worse or lasts more than 10 days
- fever gets worse or lasts more than 3 days
- redness or swelling is present
- any new symptoms occur
- ringing in the ears or a loss of hearing occurs

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

It is especially important not to use aspirin at 20 weeks or later in pregnancy unless definitely directed to do so by a doctor because it may cause problems in the unborn child or complications during delivery.

Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Aspirina Cafeina Caplets

Directions

- drink a full glass of water with each dose
- adults and children 12 years and over: take 2 caplets every 6 hours not to exceed 8 caplets in 24 hours
- children under 12 years: consult a doctor

Other information

- save carton for full directions and warnings
- Store at room temperature

Inactive ingredients carnauba wax, corn starch, D&C red #30 aluminum lake, D&C yellow #10 aluminum lake, hypromellose, powdered cellulose, propylene glycol, shellac, titanium dioxide, triacetin

Questions or comments? 1-800-331-4536 (Mon-Fri 9AM - 5PM EST)

Aspirina Cafeína Caplets

Spanish –

Información del medicamento

Principios activos (en cada cápsula)

Efecto

Aspirina 500 mg (AINE)*.....	Analgésico
Cafeína 32.5 mg.....	Ayuda analgésica
*Fármaco antiinflamatorio no esteroideo	

Usos para el alivio temporal de lo siguiente:

- dolor de cabeza • dolor de espalda • dolores musculares
- dolores menores debido a la artritis

Advertencias

Síndrome de Reye: Los niños y adolescentes que tienen varicela, o se están recuperando de ella o tienen síntomas parecidos a los de la gripe, no deben usar este producto. Cuando se utiliza este producto, si se producen cambios en la conducta y se presentan náuseas y vómitos, consulte a un médico porque estos síntomas podrían ser un signo temprano del síndrome de Reye, una enfermedad rara pero grave.

Alerta de alergia: La aspirina puede provocar una reacción alérgica grave que puede incluir:

- urticaria • edema facial • asma (sibilancia) • choque

Advertencia de sangrado estomacal: Este producto contiene un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE), que puede causar una grave hemorragia estomacal. Las posibilidades son mayores si usted

- tiene 60 años o más
- ha tenido úlceras estomacales o problemas de sangrado
- toma un anticoagulante o un medicamento esteroideo
- toma otros medicamentos que contienen antiinflamatorios no esteroideos (AINE) con o sin receta (aspirina, ibuprofeno, naproxeno u otros)
- toma 3 o más bebidas alcohólicas todos los días mientras usa este producto
- toma más o por más tiempo de lo indicado

No lo use

- si es alérgico a la aspirina o a cualquier otro analgésico/antifebril
- si ha presentado reacciones alérgicas a este producto o a cualquiera de sus componentes

Antes de tomar este producto, consulte a su médico en los siguientes casos:

- si la advertencia de sangrado estomacal se aplica a usted
- si tiene antecedentes de problemas estomacales, como acidez estomacal
- si tiene hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, cirrosis hepática o enfermedad renal
- si está tomando diuréticos
- si tiene asma

Consulte a su médico o a un farmacéutico antes de usar este producto si actualmente está tomando un medicamento de venta con receta para

- la gota • la diabetes • la artritis

Suspenda su uso y pregúntele a un médico en los siguientes casos:

- si se produce una reacción alérgica. Busque ayuda médica de inmediato.
- si presenta cualquiera de los siguientes signos de sangrado estomacal:
 - sensación de mareo • vómitos de sangre • heces negras o con sangre
 - dolor de estómago que no mejora
- si el dolor empeora o dura más de 10 días
- si la fiebre empeora o dura más de 3 días
- si hay enrojecimiento o hinchazón
- si aparecen nuevos síntomas
- si tiene zumbido en los oídos o pérdida de la audición

Aspirina Cafeina Caplets

Si está embarazada o amamantando, consulte a un profesional de la salud antes de usar este producto.

En especial, es importante no tomar aspirina al llegar a las 20 semanas o más de embarazo, a menos que su médico le indique claramente que lo haga, porque esto puede provocar problemas en el bebé en gestación o complicaciones durante el parto.

No dejar al alcance de los niños. En caso de sobredosis, póngase en contacto con un médico o un centro de control de intoxicaciones inmediatamente.

Instrucciones

- beber un vaso de agua lleno con cada dosis
- adultos y niños mayores de 12 años: tomar 2 cápsulas cada 6 horas sin exceder 8 cápsulas en 24 horas
- niños menores de 12 años: consultar al médico

Otra información

- guarde la caja para consultar las instrucciones y advertencias
- Almacenar a temperatura ambiente

Principios inactivos cera de carnauba, almidón de maíz, laca de aluminio D&C rojo #30, laca de aluminio D&C amarillo #10, hipromelosa, celulosa en polvo, propilenglicol, goma laca, dióxido de titanio, triacetina

¿Preguntas o comentarios? 1-800-331-4536 (lunes a viernes de 9AM - 5PM EST)